



# ОСТАНОВИМ ТУБЕРКУЛЕЗ ВМЕСТЕ!



Туберкулез – заразное инфекционное заболевание, известное еще со времен Гиппократа. **Источником инфекции** являются больные активной формой туберкулеза люди и животные, выделяющие микобактерии туберкулеза (палочки Коха по имени немецкого врача Роберта Коха, открывшего возбудителя туберкулеза в конце 18 века) и инфицирующие здоровый организм.

**Инфекция передается** чаще всего воздушно – капельным и воздушно-пылевым путем – через кашель, чиханье, разговор на близком расстоянии. Туберкулез у детей протекает намного тяжелее, чем у взрослых.





Возбудитель заболевания - микобактерия туберкулеза - сохраняет жизнеспособность в течение нескольких месяцев на земле, в пыли и воде. Бактерии способны делиться на мелкие части под воздействием факторов внешней среды и склеиваться. Микобактерия туберкулёза может длительное время (годы, десятилетия) находиться в организме, не причиняя ему вреда, т.е. до тех пор, пока иммунная система человека не ослабеет, и у бактерии не появятся необходимые условия для размножения (температура 30 - 40 градусов, темное, сырое, непроветриваемое помещение). В оптимальных условиях микобактерии приобретают первоначальную форму и вновь становятся патогенными для людей. При туберкулёзе поражается весь организм: лёгкие, почки, лимфатические узлы, кости, глаза, кожа, головной мозг.



**Девиз Всемирного дня борьбы с туберкулезом 2021 года: «Время идет!», напоминает о необходимости как можно быстрее выполнить обязательства мировых лидеров по расширению доступа к профилактике и лечению туберкулеза.**

**По данным ВОЗ около трети жителей нашей планеты инфицированы микобактериями туберкулёза. Ежегодно около 10 миллионов человек заболевают туберкулёзом, около 2 миллионов человек умирают.**

### **ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА**

- Специфическая профилактика** направлена на снижение смертности, заболеваемости, предупреждение развития тяжелых форм:

**Вакцинация** проводится новорожденным на 3-7 день жизни: БЦЖ и БЦЖ-М. Прививка БЦЖ входит в число обязательных в нашей стране и включена в Национальный календарь профилактических прививок, она создает противотуберкулезнй иммунитет (невосприимчивость к туберкулёзу) и предупреждает развитие наиболее опасных клинических форм.

**Ревакцинация** проводится здоровым детям в возрасте 6 - 7 лет, имеющим отрицательную реакцию Манту.

- **Иммунодиагностика** с применением внутрикожных проб Манту и Диаскинеста для раннего выявления туберкулезной инфекции в организме детей:
  - Проба Манту – диагностический тест, свидетельствующий о напряженности иммунитета к туберкулезной инфекции, позволяет установить, насколько иммунная защита эффективна. После получения результатов пробы отбираются дети для проведения ревакцинации.
  - Проба Диаскинест дает возможность определить заражен человек туберкулезом или нет в то время, когда заболевание находится в латентной форме.
- **Ежегодное прохождение взрослыми флюорографического обследования.**
- **Меры, направленные на повышение устойчивости организма детей и подростков к инфекции:**
  - **ведение здорового образа жизни в семье:** отказ от наркотиков, алкоголя и табакокурения; пассивное курение создает угрозу возникновения и обострения у детей астмы, бронхита и пневмонии;
  - **полноценное питание не менее 4-5 раз в день,** богатое белком, микроэлементами и витаминами;
  - **достаточное пребывание на свежем воздухе:** прогулки в любую погоду не менее 3-х часов в день;
  - **регулярная влажная уборка и проветривание помещений;**
  - **проведение закаливания** посредством воздуха, солнца и воды;
  - **исключение стрессовых ситуаций;**
  - **соблюдение гигиены сна (обеспечение достаточной продолжительности в зависимости от возраста детей).**

